

Criterios diagnósticos de la dermatitis atópica canina

Hasta hace pocos años se empleaban diversas encuestas durante la consulta que servían para confirmar o dar un mayor peso al diagnóstico de la dermatitis atópica canina. Dichos criterios se conocen por los autores que los desarrollaron y evaluaron, entre ellos Willemse y Prelaud.

En la actualidad los criterios diagnósticos que han demostrado una mayor fiabilidad (sensibilidad y especificidad del 80%) son los desarrollados por el dermatólogo veterinario Austriaco Favrot. Según este autor, si se responden afirmativamente 5 de dichos criterios tendremos una alta probabilidad de estar ante un perro atópico.

Estos son los criterios diagnósticos de la DA para Claude Favrot:

- Aparición de los síntomas antes de los 3 años de edad.
- Aparición del prurito previo a las lesiones.
- Buena respuesta a tratamientos esteroideos.
- Es un animal que pasa la mayor parte del tiempo en el interior del domicilio.
- Extremidades anteriores afectadas.
- Pabellones auriculares afectados.
- Margen de las orejas libres de lesiones.
- Región dorsolumbar sin lesiones.

Si su perro se rasca de modo insistente, pruebe a contestar este test, es un método rápido y fiable para saber si puede padecer esta enfermedad. **Si su respuesta ha sido afirmativa en al menos 5 de estas 7 preguntas, la probabilidad de que su perro padezca una alergia cutánea debida a sustancias ambientales (ácaros, pólenes, etc) es de un 80 %.**

Germán Quintana Diez

Veterinario responsable del Servicio de Dermatología

Centro Veterinario A Marosa

www.cvmarosa.com